

ALGICLER GEL PRP 2.19
Medidas: 149 mm x 155 mm
Imprime: Pantone Gris 425
+ Pantone Azul 300

ALGICLER® GEL DÉRMICO

DICLOFENAC DIETILAMINA

Lea detenidamente esta información y ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico y antiinflamatorio de uso tópico.

PARA QUÉ SE USA ALGICLER GEL

ALGICLER GEL está destinado para el alivio del dolor y la inflamación localizada producida en músculos, tendones, articulaciones y ligamentos, provocados por torceduras, contusiones, traumatismos o esguinces.

ALGICLER GEL también está indicado en casos de dolor de espalda, dolor de cuello, torticolis, codo de tenista, lumbalgias, artrosis y dolores reumáticos.

CÓMO SE USA ALGICLER GEL

Aplique una capa delgada de ALGICLER GEL sobre el área afectada masajeando suavemente hasta su total absorción, 3 a 4 veces al día.

No exceda la dosis recomendada ni aplique sobre grandes superficies.

Este medicamento es exclusivamente para uso externo y solo debe utilizarlo sobre la piel sana. Evite todo contacto con los ojos y las mucosas (bucal, nasal, anal o genital).

Lave cuidadosamente las manos después de cada aplicación, salvo que las mismas sean el motivo del tratamiento. En este caso recomendamos

tomar precauciones y evitar el contacto posterior con ojos y mucosas.

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ALGICLER GEL

No utilice este medicamento si sabe que es alérgico a alguno de sus componentes o al ácido acetilsalicílico o a algún otro antiinflamatorio no esteroide.

No utilice este medicamento en niños menores de 12 años.

No utilice este medicamento si está en los últimos tres meses de embarazo.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE UTILIZAR ALGICLER GEL

Si Usted ha padecido o padece alguna de las siguientes enfermedades: Asma o antecedentes de ataques de asma. Rinitis o urticaria por ácido acetilsalicílico o a algún otro antiinflamatorio no esteroide.

No aplique este medicamento sobre zonas extensas de la piel durante un período prolongado o en heridas u otras lesiones de la piel (por ejemplo eczemas, lesiones cutáneas infectadas o que están supurando).

Consulte a su médico en los siguientes casos: si está embarazada (especialmente a partir del sexto mes) o dando de mamar; si recuerda haber tenido trastornos de tipo alérgico con cualquier otro medicamento.

Consulte a su médico inmediatamente e interrumpa su aplicación si una

vez iniciado el tratamiento se agravan los síntomas o si aparecen síntomas nuevos o si aparece enrojecimiento o irritación de la piel o si el dolor persiste por más de 7 días.

Si Usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO

En personas susceptibles pueden aparecer trastornos leves por dermatitis de contacto como enrojecimiento, ardor de la piel, picazón, erupciones e hinchazón que desaparecen espontáneamente o con la suspensión del tratamiento.

Si se presenta alguno de esos síntomas, o dificultad para respirar, crisis de asma y/o reacciones alérgicas severas, suspenda la medicación y consulte con su médico.

Evite exponer al sol el área tratada por el riesgo de aparición de reacciones de fotosensibilidad.

Si este medicamento le produjo algún EFECTO ADVERSO / NO DESEADO o NO CAUSÓ EFECTO, comuníquese con el ANMAT mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ON-LINE disponible en: <http://www.anmat.gob.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

ALGICLER® GEL DÉRMICO

DICLOFENAC DIETILAMINA

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI UTILICÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

En caso de sobredosis comuníquese inmediatamente con un centro asistencial.

Centros asistenciales:

Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
Gallo 1330, Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4962-6666 / 0800 444 8694

Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina. U.B.A.: Paraguay 2155, Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: (011) 5950-9500.

Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas:
Presidente Illia 999, Haedo.
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Niños de La Plata:
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.
Tel.: 0800 222 9911 / (0221) 451-5555

Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde:
Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063

Tiene Usted alguna pregunta (011) 4304-4524
ó ANMAT Responde 0800 333 1234

PRESENTACIÓN:
Pomo conteniendo 50 g.
USO EXTERNO

Conservar a temperatura desde 2°C hasta 30°C.

MANTÉNGASE ESTE Y CUALQUIER OTRO MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ALGICLER GEL PRP 2.19
Medidas: 149 mm x 155 mm
Imprime: Pantone Gris 425
+ Pantone Azul 300

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI UTILICÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

En caso de sobredosis comuníquese inmediatamente con un centro asistencial.

Centros asistenciales:

Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
Gallo 1330, Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4962-6666 / 0800 444 8694

Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina. U.B.A.: Paraguay 2155, Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: (011) 5950-9500.

Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas:
Presidente Illia 999, Haedo.
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Niños de La Plata:
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.
Tel.: 0800 222 9911 / (0221) 451-5555

Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde:
Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063

Tiene Usted alguna pregunta (011) 4304-4524
ó ANMAT Responde 0800 333 1234

PRESENTACIÓN:
Pomo conteniendo 50 g.
USO EXTERNO

Conservar a temperatura desde 2°C hasta 30°C.

MANTÉNGASE ESTE Y CUALQUIER OTRO MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ATENCIÓN
Buscando el máximo aprovechamiento de su contenido, y por tratarse de un gel, la cámara de aire del pomo de ALGICLER GEL es mayor que lo habitual. Esto no significa disminución alguna del contenido declarado.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, ALGICLER GEL no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase. Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 49.769.

Venta Libre. Industria Argentina
Directora Técnica:
Farmacéutica Filomena Freire.

N° de Registro Sanitario en Bolivia para Venta bajo Receta: II-51555/2014
Importado y Distribuido en Bolivia por:
Laboratorios ABD Ltda.

Fecha de la última revisión del prospecto por ANMAT: Julio / 2019.

Un medicamento de Monserrat y Eclair

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S. A.
Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAI Ciudad de Buenos Aires
Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas

8169



M&E



ALGICLER® GEL DÉRMICO

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR

Eficacia y seguridad para recomendar

Excipientes: carbomer 940, alcohol isopropílico, propilenglicol, metilparabeno, propilparabeno, cetomacrogol 1000, vaselina líquida, cetil éster cera, trietanolamina p/pH 6,5-8,0; agua purificada c.s.p. 100 g.

Medicamento Libre de Gluten



DICLOFENAC DIETILAMINA

QUÉ CONTIENE ALGICLER GEL

Cada 100 gramos contiene:
Diclofenac dietilamina 1,160 g equivalente a Diclofenac sódico 1 gramo.