

# BUCOTRICIN® COLUTORIO

TIOTRICINA - BENZOCAÍNA

## ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiséptico, anestésico y desinfectante de acción local específica para infecciones de la cavidad bucofaringea. Desodorizante bucofaringeo.

## INDICACIONES:

Tratamientos odontológicos: Estomatitis, gingivitis, glositis, alveolitis, pericoronaritis, periodontitis, enfermedad periodontal. Aftas.

Prevención pre y post extracciones dentarias. Cirugía dentomaxilar.

Tratamientos laringológicos: Laringitis, faringitis, amigdalitis. Tratamiento coadyuvante en anginas de diversa etiología. Prevención pre y post amigdalectomías.

## POSOLOGÍA - MODO DE USO:

Salvo mejor criterio profesional, BUCOTRICIN Colutorio se utiliza diluyendo una a dos cucharaditas de las de café (2,5 a 5 ml) en medio vaso de agua tibia realizando buches o gargarismos, de acuerdo a la localización de la afección, cada 4 a 6 horas.

En caso de lesiones focalizadas o circunscriptas, BUCOTRICIN Colutorio puede utilizarse puro, sin diluir, mediante topificaciones con hisopos embebidos en la solución.

Por su agradable sabor, sensación de frescura y acción desodorizante, BUCOTRICIN Colutorio no requiere posteriores enjuagues bucales y puede utilizarse como tal.

## ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

La tirotricina ejerce una acción bactericida sobre gérmenes Gram + y

cocos Gram - sin que se haya manifestado resistencia bacteriana a esta sustancia o resistencia cruzada con otros antibióticos.

La acción analgésica y anestésica es ejercida por la benzocaína y se produce en forma inmediata por contacto directo con la mucosa.

## FARMACOCINÉTICA:

Por su aplicación local sobre la mucosa bucofaringea los componentes de BUCOTRICIN Colutorio no se absorben.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

## REACCIONES ADVERSAS:

A las dosis recomendadas no presenta.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Las cualidades antiépticas y desodorizantes de BUCOTRICIN Colutorio pueden modificar el sabor de las comidas o bebidas que se ingieran inmediatamente después de su uso.

BUCOTRICIN Colutorio está destinado exclusivamente para su aplicación en forma de buches, gargarismos o topificaciones.

## SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de sobredosificación por ingestión accidental comunicarse con un centro toxicológico:

**Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:**  
Gallo 1330, Ciudad de Buenos Aires.  
Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

**Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, U.B.A.:**  
Paraguay 2155, Ciudad de Buenos Aires.  
Teléfono: (011) 5950-9500.

**Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas:**  
Presidente Illia 999, Haedo.  
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**Hospital de Niños de La Plata:**  
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.  
Tel.: 0 800 222 9911 / (0221) 451-5555.

Última revisión del prospecto aprobada por A.N.M.A.T.: Marzo / 2015.

## PRESENTACIONES:

BUCOTRICIN COLUTORIO:  
Frascos conteniendo 60 ml de solución.

## Otras formas farmacéuticas:

BUCOTRICIN CARAMELOS:  
Envases conteniendo 9 caramelos.

BUCOTRICIN COMPRIMIDOS DESLEÍBLES:  
Envases conteniendo 12 comprimidos.

Conservar a temperatura ambiente hasta 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 57.626.  
Venta bajo receta. Industria Argentina.

Directora Técnica:  
Farmacéutica Filomena Freire.

**LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR**  
Virrey Cevallos 1623/25/27  
C1135AAI Ciudad de Buenos Aires.  
Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524  
y líneas rotativas.



**BUCOTRICIN® COLUTORIO**

**M&E**

TIOTRICINA - BENZOCAÍNA

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR  
*Eficacia y seguridad para recomendar*

## FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

**Tiotricina 0,1 g**

**Benzocaína 4 g**

Excipientes: clorofila hidrosoluble, eugenol, esencia de menta, esencia de canela, tween 20, sacarina sódica, agua purificada, alcohol c.s.

Medicamento Libre de Gluten

