

# GARGALETAS®

## 9 CARAMELOS ANTIBIÓTICOS PARA LA GARGANTA

### QUÉ CONTIENE GARGALETAS

Fórmula: Cada caramelo contiene:

**Gramicidina** 0,25 miligramos,  
**Neomicina** como sulfato 2,5 miligramos,  
**Benzocaína** 10 miligramos.

Excipientes: glucosa, esencia de limón,  
amarillo quinolina, azúcar molida c.s.

### QUÉ ACCIÓN TIENE GARGALETAS:

Antiséptico bucofaringeo con acción anestésica.

### PARA QUÉ SE USA GARGALETAS

GARGALETAS produce alivio  
temporario del dolor y la inflamación  
de boca y garganta.

### CÓMO SE USA GARGALETAS

Adultos y niños mayores de 12 años:  
1 caramelo GARGALETAS cada 3 ó 4  
horas. Deje disolver lentamente el  
caramelo en la boca.

Se recomienda no masticarlo ni  
tragarlo sin disolver ya que no  
producirá sus efectos terapéuticos.

Dosis máxima: hasta 6 caramelos por  
día. No exceda la dosis máxima.

Si el dolor de garganta persiste más  
de 2 días o empeora, suspenda el  
tratamiento y consulte a su médico.

Este medicamento no es una  
golosina. Contiene azúcar.

### QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GARGALETAS

No lo utilice en menores de 12 años.

No use este medicamento si Usted  
sabe que es alérgico a alguno de sus  
ingredientes.

Si Ud. recibe algún otro medicamen-  
to, está embarazada o dando pecho a  
su bebé consulte a su médico antes  
de tomar este medicamento.

### QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

Consulte a su médico si el dolor de  
garganta es severo o se acompaña de  
dificultad en la respiración o si es

seguido de fiebre, dolor de cabeza,  
enrojecimiento, hinchazón, náuseas  
o vómitos.

No lo utilice en caso de lesiones  
muy extensas en boca o garganta.

### QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO

Pueden aparecer efectos no  
deseados causados por este  
medicamento como reacciones  
alérgicas, prurito, rash cutáneo,  
enrojecimiento, edemas o  
somnolencia.

Suspenda su uso y consulte a su  
médico si el dolor de garganta  
aumentara o se acompañara de fiebre,  
náuseas, vómitos, dolor de cabeza,  
hinchazón, enrojecimiento  
o dificultad para respirar.

Este medicamento produce  
habitualmente una disminución  
transitoria de la sensibilidad normal  
de la lengua y la boca, se recomienda  
utilizarlo lejos de las comidas.



7 795334 428868

MONSERRAT  
Y ECLAIR

MONSERRAT  
Y ECLAIR

### QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD QUE LA NECESARIA:

Concurre al centro de asistencia médica  
más cercano o comuníquese  
telefónicamente  
con un centro de intoxicaciones.

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez  
Teléfonos (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Prof. Dr. Alejandro Posadas  
Teléfonos (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan  
Teléfono (011) 4941-8650

Hospital de Clínicas Gral. San Martín  
Teléfono (011) 4961-6001

Lea atentamente esta información  
y ante cualquier duda consulte  
a su médico y/o a su farmacéutico.

Última revisión del prospecto  
aprobada por A.N.M.A.T.: Octubre 2014

### TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA

ANMAT Responde 0800-333-1234  
ó (011) 4304-4524

# GARGALETAS®

**GRAMICIDINA  
NEOMICINA  
BENZOCAÍNA**



M&E

ABRA  
POR AQUÍ

## CARAMELOS ANTIBIÓTICOS PARA LA GARGANTA

### MODO DE CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura ambiente.

Como todo medicamento, no debe  
consumirse después de la fecha de  
vencimiento que figura en el envase.

No utilice este medicamento  
si el envase está abierto  
o presenta marcas de adulteración.

Medicamento autorizado por el  
Ministerio de Salud. Certificado Nº 42.886

Dirección Técnica:  
Farmacéutica Filomena Freire.  
Elaborado en: Gral. Rodríguez 2830, CABA.

Venta Libre. Industria Argentina  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Medicamento Libre de Gluten

Laboratorios **MONSERRAT Y ECLAIR** S.A.

Virrey Cevallos 1623/25/27  
C1135AAI Ciudad de Buenos Aires.  
Telfax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas



M&E