

## **AJOMAST®** *EXTRACTO DE BULBO DE AJO*

*COMPRIMIDOS RECUBIERTOS*

Venta libre. Industria Argentina

Lea con cuidado esta información antes de tomar este medicamento

### **ACCIÓN:**

AJOMAST es un medicamento que favorece la circulación venosa, coadyuva con el tratamiento antihipertensivo de la hipertensión leve o moderada y colabora en la reducción de los niveles de triglicéridos y de colesterol.

### **PARA QUÉ SE USA AJOMAST**

Medicamento tradicional a base de ajo que, cuando se asocia a tratamiento dietético, ejercicio y pérdida de peso, ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos ligeramente elevados, una vez que el médico haya descartado una situación clínica seria. Esta indicación se basa exclusivamente en su uso tradicional.

### **CÓMO SE USA AJOMAST**

Este medicamento no está indicado en niños y adolescentes menores de 18 años.

Durante el primer mes se recomienda tomar: 2 comprimidos de AJOMAST, 2 a 3 veces por día, antes de las principales comidas.

Dosis de mantenimiento:

1 comprimido de AJOMAST 2 a 3 veces por día.

Se recomienda la toma del medicamento junto con alimentos para evitar trastornos gastrointestinales.

### **QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO**

No tome este medicamento si es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de este producto.

En caso de hipertiroidismo.

Si se tiene tendencia a sangrado o existe riesgo de hemorragia.

### **EMBARAZO, LACTANCIA Y FERTILIDAD:**

La seguridad durante el embarazo y la lactancia no ha sido establecida. En ausencia de suficiente información, no se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia. Los preparados de ajo pueden producir un sabor desagradable de la leche materna. Algunos estudios en animales han mostrado efecto sobre la fertilidad.

### **INTERACCIONES:**

#### **Toma de AJOMAST con otros medicamentos:**

Informe a su farmacéutico o médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Los preparados de ajo pueden modificar los tiempos de coagulación de la sangre, por ello deberán ser utilizados con precaución por pacientes en tratamiento con anticoagulantes como ser warfarina, heparina y antiagregantes plaquetarios.

No utilice preparados de ajo si está en tratamiento con isoniazida.

No utilice preparados de ajo si está en tratamiento por S.I.D.A. (por ejemplo con inhibidores de la transcriptasa inversa: neviraparina, delavirdina, efavirenz).

Utilice los preparados de ajo con precaución si está en tratamiento con anticonceptivos o ciclosporina.

### **QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO:**

#### **Advertencias y precauciones:**

Consulte a su médico sobre la conveniencia del tratamiento y para excluir que la elevación de los niveles de colesterol y triglicéridos se deba a una situación clínica seria. Se ha descrito que el ajo o sus componentes pueden incrementar el riesgo de hemorragia.

Se debe dejar de tomar estos preparados una semana antes de una intervención quirúrgica.

Administrar con precaución en pacientes con úlcera gástrica y gastritis.

Este preparado de ajo no es una alternativa a otros tratamientos de prevención utilizados en terapia cardiovascular.

Si los síntomas persisten o empeoran durante el uso del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

### Posibles efectos adversos:

Los preparados de ajo pueden provocar náuseas, vómitos, diarrea aguda, problemas gastrointestinales menores, como irritación de la mucosa y sensación de plenitud gástrica, anorexia. La frecuencia de aparición de estos efectos adversos no se conoce.

Se han descrito casos de reacciones alérgicas (dermatitis de contacto), algunas veces conjuntivitis alérgicas graves, rinitis, broncoespasmo. Dolor de cabeza, mareo, sudoración intensa. Raramente sangrado.

### QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD QUE LA NECESARIA:

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de intoxicaciones:

(011) 4658-7777 ó (011) 4962-6666/2247 ó (0221) 451-5555

### TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA

(011) 4304-4524 ó ANMAT Responde - 0800 333 1234

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

Forma de conservación: conservar a temperatura de hasta 30° C.

Presentación: envases con 60 comprimidos recubiertos.

Elaborado en Galicia 2652, Buenos Aires.

Dirección Técnica: Farmacéutica Filomena Freire.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 4.045.

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la A.N.M.A.T.: Abril 2016

Laboratorios MONSERRAT Y ECLAIR S. A.

Virrey Cevallos 1623/25/27

C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas



**AJOMAST®** EXTRACTO DE BULBODEAJO

**M&E**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**COMPRIMIDOS  
GASTRORRESISTENTES**

**LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR**  
*Eficacia y seguridad para recomendar*

### FÓRMULA:

Cada comprimido contiene

**extracto de bulbo de ajo 50 mg.**

Excipientes: lactosa, almidón de maíz, gelatina, dextrina, acetato de celulosa, aerosil, estearato de magnesio, dióxido de titanio, polietilenglicol 6000, talco, dibutilftalato, colorante pardo 2400.

Medicamento Libre de Gluten

