

Venta libre

Industria Argentina

Lea con cuidado esta información antes de tomar este medicamento

ACCIÓN:

Antiséptico y desinfectante.

PARA QUÉ SE USA POVICLER

POVICLER se utiliza para desinfectar la piel en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras.

CÓMO SE USA POVICLER

Después de lavar y secar, aplicar una pequeña cantidad del producto sobre la zona afectada, 2 a 3 veces al día.

Si los síntomas persisten o empeoran después de 48-72 horas suspenda la aplicación y consulte a su médico.

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN UTILIZAR POVICLER:

No use este medicamento si Usted sabe que es alérgico a alguno de sus ingredientes; no utilizar junto a otros desinfectantes o antisépticos tópicos.

No utilizar si tiene antecedentes de hipersensibilidad o alergia al yodo o en caso de enfermedad de la glándula tiroides.

No utilizar en menores de 5 años.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

No utilice este medicamento si: sufre quemaduras que afectan a más del 20% de la superficie corporal; tiene heridas grandes o abiertas; padece enfermedades del hígado o riñón; sufre problemas de tiroides; está siendo tratado con medicamentos que contienen litio.

Este medicamento es de uso externo: colocar exclusivamente sobre la piel, evite el contacto con ojos, oídos y mucosas.

Si Usted recibe algún otro medicamento, está embarazada (principalmente si está cursando el segundo o tercer mes del embarazo) o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO

Durante el período de utilización del producto pueden aparecer los siguientes efectos adversos: irritación local, picazón, ardor.

Si esto sucede, suspenda la medicación, lave con agua y consulte al médico.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con abundante agua.

QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS

Concurra al centro más cercano de asistencia médica o comuníquese telefónicamente con un centro de intoxicaciones.

• Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez:

Teléfonos (011) 4962-6666 / 2247

• Hospital Dr. Alejandro Posadas:

Teléfonos (011) 4654-6648 / 4658-7777

• Hospital de Pediatría Dr. Garrahan:
Teléfono (011) 4941-8650

• Hospital de Clínicas Gral. San Martín:
Teléfono (011) 4961-6001

INFORMACIÓN GENERAL

La piel o la indumentaria en contacto con POVICLER puede tomar una coloración oscura que se elimina fácilmente con agua.

La povidona-iodo en contacto con aprestos o suavizantes toma un color azulado fácilmente lavable con agua.

Luego de su utilización, asegúrese de cerrar correctamente el frasco ya que los vapores del yodo pueden afectar materiales sintéticos, revestimientos o pinturas.

TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA

ANMAT Responde 0800 333 1234
(011) 4304-4524 y líneas rotativas

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original a temperatura de hasta 30° C.

PRESENTACIONES

Frascos conteniendo 60 ml.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

Dirección Técnica:
Farmacéutica Filomena Freire.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 40.242.

Fecha de la última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT:
Mayo 2015.

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S. A.

Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas



M&E

POVICLER® SOLUCIÓN

POVIDONA IODO 10%

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR
Eficacia y seguridad para recomendar

QUÉ CONTIENE POVICLER

Cada 100 ml contiene:

Povidona yodo 10 g

Excipientes: fosfato trisódico c.s.p., pH 5.5, polisorbato 20, agua purificada c.s.p., 100 ml.